

ID番号 @PATIENTID

病名(他に考える病名)

担当医師 @USERNAME

入院診療計画書(直腸切除術を受ける患者様へ)

氏名 @PATIENTNAME 様

@PATIENTWARD 病棟

@PATIENTROOM 号室

印

担当看護師

症状

担当薬剤師

@SYSDATE

月日	入院日 術前々日	術前日	手術日(/)		術翌日	術後2日~4日目	術後5日目	術後6日~	退院日
			術前	術後					
経過		検査データを確認しながら、手術へむけて準備を行います。術前準備を行います	()時に手術室へ移動します	術後は病室に帰ります	注意点を守りながら、少しずつ、日常生活のリズムに戻していきましょう	水分開始になります	食事開始になります		退院
目標		術前日の流れ / ()時~絶食 / ()時~絶飲食	朝起きてから手術に行くまでの流れ			むせり・吐き気がないか	少しす、よく噛んで、時間をかけて食べて下さい。		外来受診について定期受診は必ず行なうようにしましょう。
検査	手術に必要な検査をします				採血・レントゲン写真	採血・レントゲン写真	必要に応じて採血・レントゲン写真	(退院まで)	<ul style="list-style-type: none">腹痛がひどい時排便、排ガスがなく、お腹の張りが続いている時嘔吐が続き、吐き気がひどい時黒い便が出た時高熱が出たり微熱が何日も続くような時 わからない点、疑問点がありましたら、何でも医師や看護師にご相談ください。
処置	基本的に、処置はありません	□おへその周りの毛を剃ります □おへそのそじをします □入浴 □点滴 □10時 } 下剤を服用します □14時 □腕に名前を書きます(医師) 	□麻酔科医師の指示の内服薬があれば服用してください □前あきの下着、病院のパジャマに着がえて下さい □ 弾性ストッキング をはいて下さい □化粧やマニキュアを落として下さい □義歯、めがね、時計、ヘアピン、指輪を外して下さい。 □家族の方に、貴重品を渡して下さい	心電図モニター 点滴 酸素吸入 尿の袋 肛門の管 胃の管	酸素と心電図モニターが終了します 尿の管と胃の管が抜けます 痛み止めの管が抜けます お腹に管が入っている場合主治医が抜きます			術後7日目に半抜糸 8日目に全抜糸します	
注射	基本的に、注射はありません								
内服	飲んでいるお薬は全て看護師にお知らせ下さい								退院時、必要な分のお薬が処方されます
食事									職場復帰、旅行などは医師に相談して下さい
清潔行動	活動、入浴に制限はありません		病棟を離れるときは、看護師にお知らせ下さい。	痛み止めについて… <ul style="list-style-type: none">点滴から痛み止めを注入する場合背中に管を入れて痛み止めを注入する場合いずれにしても、痛いときは我慢せずに教えて下さい					入浴のときは… 熱いお湯は体の疲労を伴います。長湯にならないようにしましょう。
説明	病棟での日常生活をご案内します 手術の予定を説明します	麻酔科医師と、手術室の看護師の訪問があります							口次回予約票が渡されます ロリットバッドを外します
腸の手術を受けられる方へ			腸には、食品の栄養分が吸収された後の残渣物から水分を吸収し、便を作る働きがあります。手術によって腸の中に残渣物が留まる時間が短くなり、下痢の傾いたり便秘に傾いたりと、排便の調節が難しくなっています。 腸閉塞が起きやすい状態になっていますので、食生活に十分に気をつけて、排便調節をしていく必要があります。	食事について… 偏食を避け、バランスのとれた食事を心がけて下さい。 以下の食べ物は、控えるかよく噛んで食べて下さい。 <ul style="list-style-type: none">熱すぎたり、冷たすぎたりする食べ物刺激の強い食べ物…香辛料・わさびなど消化の悪い食べ物…イカ・たこ・するめ・キノコ類・海草類など その他 <ul style="list-style-type: none">下痢になりやすい食べ物…冷たい牛乳・天ぷら類・アルコール類・アイスクリームなど便秘を予防する食べ物…野菜類・バナナ・ブルー・果物など	安静運動に関して… 適度な運動は、腸の血行を良くし、動きを活発にします。軽い散歩や体操などから始め、体を慣らしていって下さい。疲れたら無理をせず、休息を取って下さい。	便秘になったときは… <ul style="list-style-type: none">腹部「の」の字を描くようにマッサージする。水分を多めにとり、食物繊維の多い食品をとる。食物繊維の多い食品→パン・玄米・豆・芋類・果物・バナナなど下剤の乱用は慎む。	下痢になったときは… <ul style="list-style-type: none">腹部の保温(腹巻き・ほっこり使用)脱水になりやすいので、水分を補給する暖かい消化の良い食べ物を摂取する。(お粥・煮込みうどん・葛湯・ヨーグルトなど)以前より下痢を起こしやすかった食べ物は、術後も控える。下痢止めの薬の乱用は慎む		

注1) 病名は現時点で考えられるものであり、今後の検査等を進めていくにしたがって変わり得るものです。

注2) 入院期間については現時点で予想されるものです。

上記内容について説明を受け同意いたしました

署名 :

統査 :

特別な栄養管理の必要性
有 • 無